

# Výroková a predikátová logika - V

Petr Gregor

KTIML MFF UK

ZS 2021/22

# Rezoluční metoda - úvod

Hlavní rysy **rezoluční metody** (*neformálně*)

- je základem mnoha různých systémů, např. interpret Prologu, SAT řešiče, systémy pro automatické dokazování / verifikování, ...
- předpokládá formule v **CNF** (převod obecně “*drahý*”),
- pracuje s **množinovou reprezentací** formulí,
- má jediné odvozovací pravidlo, tzv. **rezoluční pravidlo**,
- nemá žádné explicitní axiomy (či atomická tabla), ale jisté axiomy jsou skryty “*uvnitř*”,
- obdobně jako u tablo metody, jde o **zamítací** proceduru, tj. snaží se ukázat, že daná formule (či teorie) je **nesplnitelná**,
- má různé varianty lišící se např. podmínkami pro použití rezolučního pravidla.

## Množinová reprezentace (formulí v CNF)

- **Literál**  $l$  je výroková proměnná nebo její negace.  $\bar{l}$  značí **opačný** literál k  $l$ .
- **Klauzule**  $C$  je konečná množina literálů (“*tvořících disjunkci*”). **Prázdná klauzule** se značí  $\square$ , není nikdy splněna (neobsahuje splněný literál).
- **Formule**  $S$  je množina (i **nekonečná**) klauzulí (“*tvořících konjunkci*”). **Prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna (neobsahuje nesplněnou klauzuli). Nekonečné formule reprezentují nekonečné teorie (konjunkcí axiomů).
- (**Částečné**) **ohodnocení**  $\mathcal{V}$  je libovolná **konzistentní** množina literálů, tj. neobsahující dvojici opačných literálů. Ohodnocení  $\mathcal{V}$  je **totální**, obsahuje-li pozitivní či negativní literál od každé výrokové proměnné.
- $\mathcal{V}$  **splňuje**  $S$ , značíme  $\mathcal{V} \models S$ , pokud  $C \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$  pro každé  $C \in S$ .

Např.  $((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg s) \wedge (\neg t \vee s) \wedge s)$  reprezentujeme

$$S = \{ \{ \neg p, q \}, \{ \neg p, \neg q, r \}, \{ \neg r, \neg s \}, \{ \neg t, s \}, \{ s \} \} \quad \text{a}$$

$$\mathcal{V} \models S \quad \text{pro} \quad \mathcal{V} = \{ s, \neg r, \neg p \}$$

## Rezoluční pravidlo

Nechť  $C_1, C_2$  jsou klauzule a  $l \in C_1, \bar{l} \in C_2$  pro nějaký literál  $l$ . Pak z  $C_1$  a  $C_2$  odvod' přes literál  $l$  klauzuli (tzv. *rezolventu*)

$$C = (C_1 \setminus \{l\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{l}\}).$$

Např. z klauzulí  $\{p, q, r\}$  a  $\{\neg p, \neg q\}$  lze odvodit rezolventu  $\{q, \neg q, r\}$  přes literál  $p$  nebo  $\{p, \neg p, r\}$  přes literál  $q$ .

**Pozorování** Rezoluční pravidlo je *korektní*, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$ ,

$$\mathcal{V} \models C_1 \text{ a } \mathcal{V} \models C_2 \Rightarrow \mathcal{V} \models C.$$

**Poznámka** Rezoluční pravidlo je speciální případ *pravidla řezu*

$$\frac{\varphi \vee \psi, \neg\varphi \vee \chi}{\psi \vee \chi}$$

kde  $\varphi, \psi, \chi$  jsou libovolné formule.

# Rezoluční důkaz

- **rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je **konečná** posloupnost  $C_0, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i \leq n$  je  $C_i \in S$  nebo je  $C_i$  rezolventou nějakých dvou předchozích klauzulí ( $i$  stejných),
- klauzule  $C$  je (rezolucí) **dokazatelná** z  $S$ , psáno  $S \vdash_R C$ , pokud má rezoluční důkaz z  $S$ ,
- **zamítnutí** formule  $S$  je rezoluční důkaz  $\square$  z  $S$ ,
- $S$  je (rezolucí) **zamítnutelná**, pokud  $S \vdash_R \square$ .

**Věta (korektnost)** *Je-li  $S$  rezolucí zamítnutelná, je  $S$  nesplnitelná.*

**Důkaz** Necht'  $S \vdash_R \square$ . Kdyby  $\mathcal{V} \models S$  pro nějaké ohodnocení  $\mathcal{V}$ , z korektnosti rezolučního pravidla by  $\mathcal{V}$  splňovalo každou klauzuli v rezolučním důkazu z  $S$ , tedy by platilo i  $\mathcal{V} \models \square$ , což není možné. ■

## Rezoluční strom a uzávěr

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je **konečný** binární strom s vrcholy označenými klauzulemi takový, že

- (i) kořen je označen  $C$ ,
- (ii) listy jsou označeny klauzulemi z  $S$ ,
- (iii) každý **vnitřní** vrchol je označen rezolventou z klauzulí v jeho synech.

**Pozorování**  $C$  má rezoluční strom z  $S$  právě když  $S \vdash_R C$ .

**Rezoluční uzávěr**  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je nejmenší induktivní množina definovaná


- (i)  $C \in \mathcal{R}(S)$  pro každé  $C \in S$ ,
- (ii) jsou-li  $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$  a  $C$  je rezolventa  $C_1, C_2$ , je zároveň  $C \in \mathcal{R}(S)$ .

**Pozorování**  $C \in \mathcal{R}(S)$  právě když  $S \vdash_R C$ .

**Poznámka** Všechny pojmy o rezolučních důkazech lze tedy ekvivalentně zavést pomocí rezolučních stromů či uzávěrů.

## Příklad

Formule  $((p \vee r) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q) \wedge (\neg p \vee t) \wedge (\neg s) \wedge (s \vee \neg t))$  je nespelnitelná, neboť pro  $S = \{\{p, r\}, \{q, \neg r\}, \{\neg q\}, \{\neg p, t\}, \{\neg s\}, \{s, \neg t\}\}$  je  $S \vdash_R \square$ .



Rezoluční uzávěr  $S$  je

$$\mathcal{R}(S) = \{\{p, r\}, \{q, \neg r\}, \{\neg q\}, \{\neg p, t\}, \{\neg s\}, \{s, \neg t\}, \{p, q\}, \{\neg r\}, \{r, t\}, \\ \{q, t\}, \{\neg t\}, \{\neg p, s\}, \{r, s\}, \{t\}, \{q\}, \{q, s\}, \square, \{\neg p\}, \{p\}, \{r\}, \{s\}\}.$$

# Redukce dosazením

Nechť  $S$  je formule a  $l$  je literál. Označme

$$S^l = \{C \setminus \{\bar{l}\} \mid l \notin C \in S\}.$$

## Pozorování

- $S^l$  je ekvivalentní formulí, jež vznikne **dosazením** konstanty  $\top$  (true, 1) za literály  $l$  a konstanty  $\perp$  (false, 0) za literály  $\bar{l}$  ve formulí  $S$ ,
- $S^l$  neobsahuje v žádné klauzuli literál  $l$  ani  $\bar{l}$ ,
- jestliže  $\{\bar{l}\} \in S$ , pak  $\square \in S^l$ .

**Lemma**  $S$  je splnitelná, právě když  $S^l$  nebo  $S^{\bar{l}}$  je splnitelná.


**Důkaz** ( $\Rightarrow$ ) Nechť  $\mathcal{V} \models S$  pro nějaké  $\mathcal{V}$  a předpokládejme (búno), že  $\bar{l} \notin \mathcal{V}$ .

- Pak  $\mathcal{V} \models S^l$ , neboť pro  $l \notin C \in S$  je  $\mathcal{V} \setminus \{l, \bar{l}\} \models C$  a tudíž  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{l}\}$ .
- Naopak ( $\Leftarrow$ ) předpokládejme (búno), že  $\mathcal{V} \models S^l$  pro nějaké  $\mathcal{V}$ .
- Jelikož se  $l$  ani  $\bar{l}$  nevyskytuje v  $S^l$ , je i  $\mathcal{V}' \models S^l$  pro  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{l}\}) \cup \{l\}$ .
- Pak  $\mathcal{V}' \models S$ , neboť pro  $C \in S$  obsahující  $l$  máme  $l \in \mathcal{V}'$  a pro  $C \in S$  neobsahující  $l$  je  $\mathcal{V}' \models (C \setminus \{\bar{l}\}) \in S^l$ . ■



# Strom dosazení

Postupnou redukci literálů dosazením lze reprezentovat binárním stromem.



**Důsledek**  $S$  není splnitelná, právě když každá větev obsahuje  $\square$ .

**Poznámka** Jelikož  $S$  může být nekonečná nad spočetným jazykem, strom může být nekonečný. Je-li ale  $S$  nespjitelná, dle **věty o kompaktnosti** existuje konečná část  $S' \subseteq S$ , která je nespjitelná. Pak po redukci všech literálů vyskytujících se v  $S'$  bude  $\square$  v každé větvi po konečně mnoha krocích.

# Úplnost rezoluce

**Věta** *Je-li konečná  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná, tj.  $S \vdash_R \square$ .*

**Důkaz** Indukcí dle počtu proměnných v  $S$  ukážeme, že  $S \vdash_R \square$ .

- Nemá-li nespílitelná  $S$  žádnou proměnnou, je  $S = \{\square\}$  a tedy  $S \vdash_R \square$ ,
- Necht'  $l$  je literál vyskytující se v  $S$ . Dle lemmatu,  $S^l$  a  $S^{\bar{l}}$  jsou nespílitelné.
- Jelikož  $S^l$  a  $S^{\bar{l}}$  mají méně proměnných než  $S$ , dle indukčního předpokladu existují rezoluční stromy  $T^l$  a  $T^{\bar{l}}$  pro odvození  $\square$  z  $S^l$  resp.  $S^{\bar{l}}$ .
- Je-li každý list  $T^l$  z  $S$ , je  $T^l$  rezolučním stromem  $\square$  z  $S$ , tj.  $S \vdash_R \square$ .
- Pokud ne, **doplněním** literálu  $\bar{l}$  do každého listu, jenž není z  $S$ , (a do všech vrcholů nad ním) získáme rezoluční strom  $\{\bar{l}\}$  z  $S$ .
- Obdobně získáme rezoluční strom  $\{l\}$  z  $S$  **doplněním**  $l$  ve stromu  $T^{\bar{l}}$ ,
- Rezolucí jejich kořenů  $\{\bar{l}\}$  a  $\{l\}$  získáme rezoluční strom  $\square$  z  $S$ . ■

**Důsledek** *Je-li  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná, tj.  $S \vdash_R \square$ .*

**Důkaz** Plyne z předchozího užitím věty o kompaktnosti.

# Lineární rezoluce - úvod

Rezoluční metodu můžeme značně omezit (bez ztráty úplnosti).


- **Lineární důkaz** (rezolucí) klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost dvojic  $(C_0, B_0), \dots, (C_n, B_n)$  taková, že  $C_0 \in S$  a pro každé  $i \leq n$ 
  - $B_i \in S$  nebo  $B_i = C_j$  pro nějaké  $j < i$ , a
  - $C_{i+1}$  je rezolventa  $C_i$  a  $B_i$ , kde  $C_{n+1} = C$ .
- $C_0$  zveme **počáteční** klauzule,  $C_i$  **centrální** klauzule,  $B_i$  **boční** klauzule.
- $C$  je **lineárně dokazatelná** z  $S$ , psáno  $S \vdash_L C$ , má-li lineární důkaz z  $S$ .
- **Lineární zamítnutí**  $S$  je lineární důkaz  $\square$  z  $S$ .
- $S$  je **lineárně zamítnutelná**, pokud  $S \vdash_L \square$ .

**Pozorování** Je-li  $S$  lineárně zamítnutelná, je  $S$  nespíitelná.

**Důkaz** Každý lineární důkaz lze transformovat na (korektní) rezoluční důkaz.

**Poznámka** Platí i **úplnost**, tj. je-li  $S$  nespíitelná, je  $S$  lineárně zamítnutelná.

# Příklad lineární rezoluce



a) obecný tvar lineární rezoluce,

b) pro  $S = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  je  $S \vdash_L \square$ ,

c) transformace lineárního důkazu na rezoluční důkaz.

# LI-rezoluce

Pro Hornovy formule můžeme lineární rezoluci dál omezit.

- **Hornova formule** je množina (i nekonečná) Hornových klauzulí.
- **Hornova klauzule** je klauzule obsahující nejvýše jeden pozitivní literál.
- **Fakt** je (Hornova) klauzule  $\{p\}$ , kde  $p$  je pozitivní literál.
- **Pravidlo** je (Hornova) klauzule s právě jedním pozitivním a aspoň jedním negativním literálem. Pravidla a fakta jsou **programové klauzule**.
- **Cíl** je neprázdná (Hornova) klauzule bez pozitivního literálu.

**Pozorování** Je-li Hornova formule  $S$  nespíitelná a  $\square \notin S$ , obsahuje fakt i cíl.

**Důkaz** Neobsahuje-li fakt (cíl), je splnitelná nastavením všech proměnných na 0 (resp. na 1). ■

**LI-rezoluce** (linear input) z formule  $S$  je lineární rezoluce z  $S$ , ve které je každá boční klauzule  $B_i$  ze (vstupní) formule  $S$ .

Je-li klauzule  $C$  dokazatelná LI-rezolucí z  $S$ , píšeme  $S \vdash_{LI} C$ .

# Úplnost LI-rezoluce pro Hornovy formule

**Věta** Je-li Hornova  $T$  splnitelná a  $T \cup \{G\}$  nespjitelná pro cíl  $G$ , lze  $\square$  odvodit LI-rezolucí z  $T \cup \{G\}$  začínající  $G$ .

**Důkaz** Dle věty o kompaktnosti můžeme předpokládat, že  $T$  je konečná.

- Postupujeme indukcí dle počtu proměnných v  $T$ .
- Dle pozorování,  $T$  obsahuje fakt  $\{p\}$  pro nějakou proměnnou  $p$ .
- Dle lemmatu je  $T' = (T \cup \{G\})^p = T^p \cup \{G^p\}$  nespjitelná, přičemž  $G^p = G \setminus \{\bar{p}\}$ .
- Je-li  $G^p = \square$ , je  $G = \{\bar{p}\}$  a tedy  $\square$  je rezolventa  $G$  a  $\{p\} \in T$ .
- Jinak, jelikož  $T^p$  je splnitelná (stejným ohodnocením, které splňuje  $T$ ) a má méně proměnných, dle indukčního předpokladu lze  $\square$  odvodit LI-rezolucí z  $T'$  začínající  $G^p$ .
- **Doplněním** literálu  $\bar{p}$  do všech listů, jež nejsou v  $T \cup \{G\}$ , a všech vrcholů pod ním získáme LI-odvození  $\{\bar{p}\}$  z  $T \cup \{G\}$  začínající v  $G$ .
- Závěrečnou rezolucí pomocí faktu  $\{p\} \in T$  získáme  $\square$ . ■

## Příklad LI-rezoluce

$$T = \{\{p, \neg r, \neg s\}, \{r, \neg q\}, \{q, \neg s\}, \{s\}\}, \quad G = \{\neg p, \neg q\}$$

$$T^s = \{\{p, \neg r\}, \{r, \neg q\}, \{q\}\}$$

$$T^{sq} = \{\{p, \neg r\}, \{r\}\}$$

$$T^{sqr} = \{\{p\}\} \quad G^{sq} = \{\neg p\} \quad \{p, \neg r\}$$

$$G^{sqr} = \{\neg p\} \quad \{p\}$$

$$G^{sqrp} = \square$$

$$\begin{array}{c} \{p, \neg r\} \\ | \quad / \\ \{\neg r\} \quad \{r\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$G^s = \{\neg p, \neg q\} \quad \{p, \neg r\}$$

$$\begin{array}{c} \{\neg p, \neg q\} \quad \{p, \neg r\} \\ | \quad / \\ \{\neg q, \neg r\} \quad \{r, \neg q\} \\ | \quad / \\ \{\neg q\} \quad \{q\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \{\neg q, \neg r\} \quad \{r, \neg q\} \\ | \quad / \\ \{\neg q\} \quad \{q\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$\square$$

$$G = \{\neg p, \neg q\} \quad \{p, \neg r, \neg s\}$$

$$\begin{array}{c} \{\neg p, \neg q\} \quad \{p, \neg r, \neg s\} \\ | \quad / \\ \{\neg q, \neg r, \neg s\} \quad \{r, \neg q\} \\ | \quad / \\ \{\neg q, \neg s\} \quad \{q, \neg s\} \\ | \quad / \\ \{\neg s\} \quad \{s\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \{\neg q, \neg r, \neg s\} \quad \{r, \neg q\} \\ | \quad / \\ \{\neg q, \neg s\} \quad \{q, \neg s\} \\ | \quad / \\ \{\neg s\} \quad \{s\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \{\neg q, \neg s\} \quad \{q, \neg s\} \\ | \quad / \\ \{\neg s\} \quad \{s\} \\ | \quad / \\ \square \end{array}$$

$$\square$$

$$T^{sqr}, G^{sqr} \vdash_{LI} \square$$

$$T^{sq}, G^{sq} \vdash_{LI} \square$$

$$T^s, G^s \vdash_{LI} \square$$

$$T, G \vdash_{LI} \square$$

# Program v Prologu

(Výrokový) *program* (v Prologu) je Hornova formule obsahující pouze programové klauzule, tj. fakta nebo pravidla.

<i>pravidlo</i>	$p :- q, r.$	$q \wedge r \rightarrow p$	$\{p, \neg q, \neg r\}$	
	$p :- s.$	$s \rightarrow p$	$\{p, \neg s\}$	
	$q :- s.$	$s \rightarrow q$	$\{q, \neg s\}$	
<i>fakt</i>	$r.$	$r$	$\{r\}$	
	$s.$	$s$	$\{s\}$	<i>program</i>
<i>dotaz</i>	$?- p, q.$		$\{\neg p, \neg q\}$	<i>cíl</i>

Zajímá nás, zda daný *dotaz* vyplývá z daného *programu*.

**Důsledek** Pro každý *program*  $P$  a *dotaz*  $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n)$  je ekvivalentní, zda

- (1)  $P \models p_1 \wedge \dots \wedge p_n$ ,
- (2)  $P \cup \{\neg p_1, \dots, \neg p_n\}$  je nespílitelná,
- (3)  $\square$  lze odvodit LI-rezolucí z  $P \cup \{G\}$  začínající cílem  $G = \{\neg p_1, \dots, \neg p_n\}$ .



# Rezoluce v Prologu

1) S klauzulemi interpret pracuje jako s *uspořádanými seznamy literálů*.

**LD-rezoluce** (*linear definite*) je LI-rezoluce, při které v každém kroku rezolventa aktuálního cíle  $(\neg p_1, \dots, \neg p_{i-1}, \neg p_i, \neg p_{i+1}, \dots, \neg p_n)$  a boční klauzule  $(p_i, \neg q_1, \dots, \neg q_m)$  je  $(\neg p_1, \dots, \neg p_{i-1}, \neg q_1, \dots, \neg q_m, \neg p_{i+1}, \dots, \neg p_n)$ .

**Pozorování** Každý LI-důkaz lze transformovat na LD-důkaz stejné klauzule ze stejné formule se stejnou počáteční klauzulí (cílem).

2) Výběr literálu z cílové klauzule, přes který se rezolvuje, je určen daným *selekčním pravidlem*  $\mathcal{R}$ . Typicky, “vyber první literál z aktuálního cíle”.

**SLD-rezoluce** (*selection*) dle  $\mathcal{R}$  je LD-rezoluce, při které se v kroku  $(C_i, B_i)$  rezolvuje přes literál  $\mathcal{R}(C_i)$ .

**Pozorování** Každý LD-důkaz lze transformovat na SLD-důkaz stejné klauzule ze stejné formule se stejnou počáteční klauzulí (cílem).

**Důsledek** SLD-rezoluce je *úplná* pro dotazy nad programy v Prologu.

# Prohledávací SLD-strom

*Dosud není určen výběr programové klauzule pro rezoluci s aktuálním cílem.*

**SLD-strom** programu  $P$  a cíle  $G$  pro selekční pravidlo  $\mathcal{R}$  je strom s vrcholy označenými cíly takový, že kořen je označen  $G$  a je-li nějaký vrchol označen  $G'$ , má tolik synů, kolik je **možností** rezolucí  $G'$  s programovými klauzulemi v  $P$  dle literálu  $\mathcal{R}(G')$ . Synové jsou označeni příslušnými rezolventami.

$$p :- q, r. \quad (1)$$

$$p :- s. \quad (2)$$

$$q. \quad (3)$$


$$q :- s. \quad (4)$$

$$r. \quad (5)$$

$$s :- t. \quad (6)$$

$$s. \quad (7)$$

$$?- p.$$




# Závěrečné poznámky

- Interpret Prologu **prochází** SLD-strom, způsob není předepsán.
- Implementace, které používají **DFS**, nezachovávají úplnost.

$$q :- r. \quad (1)$$

$$r :- q. \quad (2)$$

$$q. \quad (3)$$

$$?- q.$$


- Jistou kontrolu nad prohledáváním poskytuje **!**, tzv. **řez**.
- Při povolení **negace** nastanou potíže se sémantikou programů.
- Síla rezoluční metody bude více patrná v predikátové logice.