

Zkouška VPL - písemná část

16. února 2017

1. Nechť $C_n = \langle V, E \rangle$ je neorientovaný cyklus délky $n \geq 2$, t.j. graf s vrcholy $V = \{1, 2, \dots, n\}$ a hranami $E = \{\{i, i+1\} \mid 1 \leq i < n\} \cup \{\{n, 1\}\}$. Říkáme, že množina $A \subseteq E$ je *perfektní párování*, pokud každý vrchol je incidentní s právě jednou hranou z A .

Chceme (rezolucí ve VL) ukázat, že pro liché n (speciálně pro $n = 3$) nemá cyklus C_n perfektní párování. Nechť $\mathbb{P}_n = \{p_{\{i,j\}} \mid \{i,j\} \in E\}$ je množina prvovýroků, kde $p_{\{i,j\}}$ reprezentuje, že “*hrana $\{i,j\}$ je v množině A* ”.

- (a) Napište výrok φ_i , kde $1 \leq i \leq n$, nad \mathbb{P}_n vyjadřující, že “*i-tý vrchol je incidentní s právě jednou hranou z A* ”. Pomocí výroků φ_i napište teorii T_n vyjadřující, že “*množina A je perfektní párování*.” (2b)
- (b) Nechť nyní $n = 3$. Nalezněte množinovou reprezentaci teorie T_3 . (2b)
- (c) Ukažte rezolucí, že T_3 je nesplnitelná teorie. (4b)
- (d) Je $T_3 \vdash_{LI} \square$? Uveďte zdůvodnění. (2b)
2. Jsou dána následující tvrzení:
- (i) Existuje student, který pokud složí zkoušku z logiky, tak zkoušku z logiky složí všichni studenti.
- (ii) Existuje student, který pokud složí zkoušku z logiky, tak všichni studenti složí zkoušku z algebry.
- (a) Formalizujte tvrzení (i), (ii) po řadě jako sentence φ, ψ v jazyce $L = \langle P, R \rangle$ bez rovnosti, kde P, R jsou unární relační symboly a $P(x), R(x)$ značí, že “*student x složí zkoušku z logiky*”, resp. “*student x složí zkoušku z algebry*”. (2b)
- (b) Tablo metodou rozhodněte, které z formulí φ, ψ jsou logicky pravdivé. Jako zdůvodnění uveďte příslušná dokončená tabla. (4b)
- (c) Zvolte libovolnou bezespornou větou V v jednom z tabel z (b) a sestrojte kanonický model \mathcal{A} z větve V . (2b)
- (d) Je teorie $\{\psi\}$ v jazyce L konzervativní extenzí teorie $\{\varphi\}$ v jazyce $L' = \langle P \rangle$? Uveďte zdůvodnění. (2b)
3. Bud' $T = \{(\forall x)(\exists y)S(y) = x, S(x) = S(y) \rightarrow x = y\}$ teorie v jazyce $L = \langle S \rangle$ s rovností, kde S je unární funkční symbol.
- (a) Nalezněte extenzi T' teorie T o definici nového unárního funkčního symbolu P takovou, že $T' \models S(P(x)) = x$. (2b)
- (b) Napište formuli $\varphi(x, y)$ jazyka L takovou, že $T' \models \varphi(x, y) \leftrightarrow P(P(x)) = y$. (2b)
- (c) Je teorie T ω -kategorická? Uveďte zdůvodnění. (2b)
- (d) Bud' $\mathcal{Z}_k = \langle \mathbb{Z}, F_k \rangle$, kde $0 < k \in \mathbb{N}$ a $F_k(m) = m + k$ pro $m \in \mathbb{Z}$. Kolik má struktura \mathcal{Z}_k podstruktur? Kolik má \mathcal{Z}_2 vzájemně neizomorfních podstruktur? (2b)